

La flore des dunes de Sokoburu

A noter : les textes des fiches ne sont que des extraits des sources citées ; pour une information complète voir la rubrique en savoir plus ; les photos provenant des bases DORIS, Tela Botanica et INPN font l'objet d'un copyright.





Euphorbe maritime - Euphorbia paralias (Linnaeus, 1753)

- Description : - Plante vivace de 30-60 cm, glabre et glauque, à racine longue et dure

- Biotope : Plante vivace très commune sur les sables du littoral (psammophyte), parfois aussi parmi les galets fins, depuis la Grande-Bretagne et l'Atlantique jusqu'aux rivages méditerranéens. Cette euphorbe, qui adore la chaleur, fleurit entre mai et septembre et forme avec l'oyat (Ammophila arenaria) une végétation vivace pionnière des sables dunaires méditerranéenne à méditerranéo-atlantique et prépontique.

- [Photos]



[Pour en savoir plus :](#)

=> INPN Inventaire National du Patrimoine Nature [[lien](#)]

=> Tela botanica , le réseau des botanistes francophones [[lien](#)]

=> Wikipedia [[lien](#)]



Lis maritime - *Pancratium maritimum* (Linnaeus, 1753)

- Description : Le lis maritime est une plante vivace de 30 à 60 cm, à gros bulbe ovale profondément enterré.

Les feuilles glabres, larges de 12 à 20 mm, en touffes, sont souvent recourbées, enroulées, d'un vert bleuâtre. Les extrémités se dessèchent bien avant la floraison.

Les fleurs blanches, très grandes (10 à 12 cm), odorantes, sont réunies en ombelle de 3 à 15 fleurs.

- Biotope : L'espèce est localisée en bord de mer, dunes, lieux sableux. Elle prospère aussi dans les anfractuosités et les fentes sablonneuses des côtes rocheuses.

- [Photos]



[Pour en savoir plus :](#)

=> INPN Inventaire National du Patrimoine Nature [\[lien\]](#)

=> DORIS, Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques [\[lien\]](#)

Liseron des dunes - Convolvulus soldanella (Linnaeus, 1753)



- Description : Le liseron des dunes est une plante herbacée pérenne* qui se développe couchée sur le sable. Elle peut atteindre 60 cm de longueur. La tige est glabre et non volubile.

Une rosette de feuilles se déploie au niveau du sable...

- Alimentation : Comme tout végétal, le liseron des dunes élabore sa matière organique carbonée par photosynthèse à partir de dioxyde de carbone, en utilisant la lumière comme source d'énergie. Son système racinaire lui permet d'absorber l'eau et les éléments minéraux.

- Biotope : Cette espèce se rencontre sur les dunes embryonnaires et les avant-dunes mobiles du littoral marin, et occasionnellement sur les plages de sable.

- [Photos]



[Pour en savoir plus :](#)

=> INPN Inventaire National du Patrimoine Nature [\[lien\]](#)

=> DORIS, Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques [\[lien\]](#)

Panicaut maritime - Eryngium maritimum (Linnaeus, 1753)



- Description : Le panicaut de mer est une plante érigée vivace pouvant atteindre 60 cm de hauteur. Sa partie enfouie comprend une racine très longue (en moyenne 1,5 m) et épaisse ainsi que des rhizomes latéraux qui se forment à partir des tiges enfouies dans le substrat.

- Biotope : Cette espèce se rencontre en milieu bien éclairé sur les jeunes dunes et les dunes mobiles, ainsi que sur les hauts de plages, où elle contribue à stabiliser les sols.

On la trouve aussi sur des plages de galets et plus rarement sur des terrains rocheux ouverts recevant par le vent du sable et les éléments nutritifs nécessaires à son développement.

- [Photos]



[Pour en savoir plus :](#)

=> INPN Inventaire National du Patrimoine Nature [[lien](#)]

=> DORIS, Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques [[lien](#)]



Onagre bisannuelle - Oenothera biennis (Linnaeus, 1753)

- Description : - . Plante bisannuelle de 50 cm à 1 m., dressée, robuste, simple ou rameuse, velue, très feuillée

- Biotope : Lieux sablonneux, terrains vagues, çà et là dans presque toute la France.

- [Photos]



[Pour en savoir plus :](#)

=> INPN Inventaire National du Patrimoine Nature [\[lien\]](#)

=> Tela botanica, le réseau des botanistes francophones [\[lien\]](#)



Origan - Origanum vulgare (Linnaeus, 1753)

- Description : L'Origan ou Origan commun (Origanum vulgare) est une espèce de plantes herbacées vivace de la famille des Lamiacées, également nommée, entre autres, Marjolaine sauvage ou Marjolaine vivace. L'origan est parfois confondu avec la Marjolaine (Origanum majorana) ou « origan des jardins », dont il partage plusieurs caractéristiques, notamment ses vertus médicinales et aromatiques.

- [Photos]



[Pour en savoir plus :](#)

=> INPN Inventaire National du Patrimoine Nature [\[lien\]](#)

=> Wikipedia , [\[lien\]](#)

=> Tela Botanica, le réseau des botanistes francophones [\[lien\]](#)



Orpin âcre - Sedum acre (Linnaeus, 1753)

- Description : . Plante vivace de 4-8 cm, glabre, verte, densément gazonnante, à saveur piquante - souche grêle émettant de nombreux rejets stériles à feuilles densément imbriquées

- [Photos] 

[Pour en savoir plus :](#)

=> INPN Inventaire National du Patrimoine Nature [\[lien\]](#)

=> Tela botanica, le réseau des botanistes francophones [\[lien\]](#)



Oyat - *Ammophila arenaria* (Linnaeus, 1753)

- Description : *Ammophila arenaria* est une plante érigée, presque glabre, ayant une tige raide. Elle mesure de 50 cm à 1,2 m de hauteur. La couleur est verte puis jaune pâle.

Les feuilles mesurent jusqu'à 80 cm de longueur et 6 mm de largeur, leur extrémité est piquante. Elles sont luisantes et lisses sur leur face inférieure, et marquées de nervures saillantes et pubescentes sur leur face supérieure. Ces feuilles sont raides et souvent enroulées sur elles-mêmes, mettant à l'abri la face supérieure quand l'air est sec.

- Biotope : L'oyat est une espèce psammophile* (qui aime le sable). On la trouve naturellement sur les dunes mobiles et semi-fixées, où elle a aussi été largement plantée pour les stabiliser.

Cette plante se développe sur des sols bien drainés, pauvres en matières organiques et contenant moins de 1 % de sel. Elle supporte de grandes variations de température (de 10 à 40 °C).

- [Photos] 

[Pour en savoir plus :](#)

=> INPN Inventaire National du Patrimoine Nature [\[lien\]](#)

=> DORIS, Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques [\[lien\]](#)