

Index

Barbastrelle d'Europe
Grand murin
Grand rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Murin à oreilles échancrées
Petit rhinolophe





Barbastelle d'Europe (la) - Barbastella barbastellus

Taille du corps : entre 4 et 6 cm Queue : de 38 à 58 mm, la queue est aussi longue que le corps + la tête

Envergure : de 20 à 29 cm Poids : de 6 à 14 g.

Cette chauve-souris a un museau très sombre, renfrogné, épaté comme celui d'un bouledogue. Les narines s'ouvrent vers le haut. Le pelage est d'aspect « poivre et sel ».

Son vol est très adroit, en général rapide et au ras de la végétation.

Sédentaire, la barbastelle occupe toute l'année le même domaine vital.

Régime alimentaire : Son régime alimentaire est très spécifique, puisqu'elle se nourrit presque exclusivement de lépidoptères (jusqu'à 99 %), tels que pyrales et lithosies, et dans une moindre mesure aussi de diptères, des névroptères, et selon les régions, de petits coléoptères et d'araignées.

La Barbastelle quitte son gîte au crépuscule et chasse près de la végétation, souvent juste au-dessus de la couronne des arbres, en forêt le long des chemins mais aussi sous la canopée ou le long de lisière végétale.

© INPN

P. Gourdain

Pour en savoir plus :

- Wikipedia, l'encyclopédie libre . [\[lien\]](#)
- LPO, Ligue de Protection des Oiseaux [\[lien\]](#)



Index chauve-souris



Grand murin (le) - Vanessa cardui

L'une des plus grandes chauves-souris d'Europe. Le pelage est épais, court, base des poils brun-noir, le dos est clair et brun grisé, parfois teinté de roussâtre contrastant nettement avec le ventre presque blanc.

Longueur tête-corps : 6,7 - 8,4 cm

Longueur de la queue : 4,5 - 6 cm

Envergure : 35 - 45 cm Poids : 20 - 45 g

Chauve-souris de basse et de moyenne altitude, elle est essentiellement forestière mais fréquente aussi les milieux mixtes coupés de haies, de prairies et de bois.

Le Grand Murin affectionne la chaleur des régions tempérées (vallées composées de forêts, de pâturages et de terres d'agriculture traditionnelle). Pour la chasse, elle affectionne particulièrement les vieilles forêts, voire le bocage et les pâtures.

Alimentation : Cette espèce se nourrit principalement de lépidoptères nocturnes, de coléoptères (hannetons ou carabes) capturés en vol ou au sol.

© INPN

L. Arthur

Pour en savoir plus :

- Wikipedia, l'encyclopédie libre. [lien]
- Conservatoire des espaces naturels- Plan national d'actions Chiroptères [lien]



Grand rinolophe (le) - *Rhinolophus ferrumequinum*

- Habitat : La Belle-Dame affectionne les lieux découverts et tous les lieux comportant des chardons ou autres plantes-hôtes. Les plantes-hôtes sont variées : grande ortie, chardons (ce qui lui vaut son nom vernaculaire de Vanesse du chardon, et son épithète spécifique cardui, du genre de chardon *Carduus*), mauve sauvage, tussilage, bardane, artichaut, lavande. [...]

- Comportement, mode de vie : La Belle-Dame est une espèce migratrice : elle est même considérée, parmi les papillons, comme le plus grand migrateur connu. L'espèce hiverne en Afrique puis migre vers l'Europe centrale et du sud au printemps (d'avril à juin), atteignant des latitudes plus ou moins élevées selon les années. Elle se reproduit alors en Europe durant la saison chaude, accomplissant d'un à trois cycles reproductifs. À l'automne, les descendants des migrants de printemps meurent ou migrent à nouveau vers le sud. L'espèce reste donc absente d'Europe de novembre à février. [...]

© Wikipedia

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'encyclopédie libre. [[lien](#)]

- Parcs Nationaux de France [[lien](#)]



Index chauve-souris

Minioptère de Schreibers (le) - Miniopterus schreibersii

- L'adulte mesure entre 5 et 6,2 cm (pour l'ensemble tête et corps) avec une masse de 9 à 16 g et une envergure comprise entre 30,5 et 34,2 cm.

Il est souvent confondu avec le Murin de Capaccini (*Myotis capaccinii*) et le Murin de Daubenton (*Myotis daubentonii*), mais le Minioptère a des oreilles beaucoup plus petites[1] ; de plus son front bombé et ses oreilles presque carrées sur le côté sont des critères caractéristiques de l'espèce.

Le Minioptère de Schreibers hiberne et met bas dans des cavités souterraines naturelles (grottes, avens) ou artificielles telles que des entrées de galeries de mines, si bien que la pause de grillages pour fermer ces sites constitue une menace pour l'espèce.



© INPN

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'encyclopédie libre. [lien]
- Conservatoire des espaces naturels- Plan national d'actions Chiroptères [lien]



Index chauve-souris

Murin à oreilles échancrées (le) - *Myotis emarginatus*



© L. Arthur

© INPN

- Chauve-souris de taille moyenne, le pelage à l'apparence laineuse, est roux sur le dos et sans contraste net avec le ventre plus clair. La face et les membranes alaires sont brunes, une nette échancrure sur le bord du pavillon de l'oreille est visible.

Longueur tête-corps : 4.1 - 5.3 cm Longueur queue : 3.8 - 4.6 cm

Envergure : 22 - 24.5 cm Poids : 6 - 15 g

Espérance de vie : 18 ans

Parfois dans des combles relativement lumineuses et froides, mais à faibles variations de température. Individus isolés dans des grottes, des galeries et des caves où les animaux sont généralement suspendus librement dans des recoins, sur des murs et plus rarement en grappes épaisses et dans des fissures.

Alimentation : Le Murin à oreilles échancrées vole à la tombée du jour et emprunte toujours les mêmes couloirs aériens. Il chasse le long des haies et à proximité de buissons, dans les arbres ainsi que dans des étables (à l'affût ou en pratiquant le vol sur place). Il peut capturer ses proies (surtout des diptères, des papillons et des araignées) sur différents substrats.

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'encyclopédie libre. [lien]
- Conservatoire des espaces naturels- Plan national d'actions Chiroptères [lien]



Index chauve-souris



Petit rhinolophe (le) - Vanessa cardui

le Petit rhinolophe est une très petite chauve-souris, l'une des plus petites d'Europe. Il ne pèse que 4 à 7 grammes. Véritable mammifère miniature, il donne une impression de grande fragilité lorsqu'il est découvert en hibernation, suspendu sur n'importe quel support dans les caves ou les grottes. Il est alors entièrement enveloppé dans ses ailes qui forment une capsule très caractéristique

tête et corps : 37 mm à 45 mm queue : 23 mm à 33 mm

Le Petit rhinolophe chasse en forêt, surtout avec un sous-étage buissonnant, et dans des milieux semi-ouverts à la végétation très structurée. Il affectionne surtout les bocages constitués de prairies pâturées entrecoupées de haies arborées et étagées ainsi que les lisières des boisements, mais aussi les parcs et les villages avec nombreux jardins et vergers.

Alimentation et mode de chasse : Comme tous les chiroptères européens, le petit rhinolophe est un insectivore nocturne, mais celui-ci est plus particulièrement spécialisé dans la chasse de petits insectes assez lents attrapés avec beaucoup d'agilité dans la végétation buissonnante entre 2 et 5 mètres de hauteur principalement. Les proies sont attrapées en vol avec un vol plutôt lent mais très agile et papillonnant dans la végétation, il est capable de cueillir ses proies sur les feuilles,

© INPN

Pour en savoir plus :

- Wikipedia, l'encyclopédie libre. [lien]
- Conservatoire des espaces naturels- Plan national d'actions Chiroptères [lien]