

Index

Azurée porte-queue (l')
Aurore (l')
Belle-dame (la)
Citron (le)
Flambé (le)
Hespérie de la Houlque (l')
Piéride de la moutarde (la)
Piéride du navet (la)
Piéride de la rave (la)
Procris (le)
Soufré (le)
Souci (le)
Tircis (le)
Vulcain (le)



© Wikipedia

Azuré porte-queue (l') - Lampides boeticus

- Habitat : Son habitat est varié : friches, cultures, jardins d'agrément. [...]
- Description : L'imago de Lampides boeticus est un petit papillon qui a en moyenne de 2,5 à 4 cm d'envergure. [...]
- Comportement, mode de vie : En Europe, il est migrateur sur le reste de l'Espagne, de la France, de l'Italie, en Belgique, Hollande, Suisse, Allemagne, jusqu'au 54°N, rarement en Angleterre.

En France métropolitaine, il serait résident dans les départements qui bordent la Méditerranée et migrateur dans tous les autres. [...]

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia – l'encyclopédie libre. [\[lien\]](#)





© Wikipedia

Aurore (l') - Anthocharis cardamines

- Habitat : L'Aurore est présent dans toute l'Europe sauf la partie arctique et dans toute l'Eurasie jusqu'au Japon excepté certaines îles méditerranéennes. L'Aurore est présent dans tous les départements de France métropolitaine

L'Aurore se retrouve dans tous les milieux fleuris, prairies, lisières de bois, talus herbeux, bernes des routes jusqu'à 1 800 mètres d'altitude. [...]

- Description : Ce papillon a une envergure de 4 à 5 cm. [...] l'apex des ailes antérieures du mâle est orange bordé d'une petite bande noire alors que la femelle est blanche avec cette même bande à l'apex.

Le revers des ailes postérieures est marqué de vert.

- Comportement, mode de vie : Les plantes hôtes de la chenille sont des brassicacées (crucifères) comme des Cardamines : Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Cardamine hirsute (Cardamine hirsuta) ainsi que l'Alliaire officinale (Alliaria petiolata), le Sisymbre officinal (Sisymbrium officinale), la Moutarde sauvage (Sinapis arvensis), la Lunaire annuelle (Lunaria annua), [...]

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia – l'encyclopédie libre. [lien]





Belle-dame (la) - Vanessa cardui

Kardu-banesa (eu)

- Habitat : La Belle-Dame affectionne les lieux découverts et tous les lieux comportant des chardons ou autres plantes-hôtes. Les plantes-hôtes sont variées : grande ortie, chardons (ce qui lui vaut son nom vernaculaire de Vanesse du chardon, et son épithète spécifique cardui, du genre de chardon Carduus), mauve sauvage, tussilage, bardane, artichaut, lavande. [...]

- Comportement, mode de vie : La Belle-Dame est une espèce migratrice : elle est même considérée, parmi les papillons, comme le plus grand migrateur connu. L'espèce hiverne en Afrique puis migre vers l'Europe centrale et du sud au printemps (d'avril à juin), atteignant des latitudes plus ou moins élevées selon les années. Elle se reproduit alors en Europe durant la saison chaude, accomplissant d'un à trois cycles reproductifs. À l'automne, les descendants des migrants de printemps meurent ou migrent à nouveau vers le sud. L'espèce reste donc absente d'Europe de novembre à février. [...]

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [lien]

Citron (le) - *Gonepteryx rhamni*

Limoia (eu)



- Description : Citron est un papillon dont l'envergure peut varier de 25 à 55 mm (le plus souvent 40 à 45), avec des ailes découpées en forme de feuille. [...]

- Comportement, mode de vie : Le Citron hiverne à l'état d'imago puis vole à nouveau dès les premiers jours de soleil. C'est le papillon qui détient le record de longévité à l'état imaginal : il peut en effet survivre jusqu'à douze mois, avec une longue période d'hivernation où il se cache préférentiellement en groupe dans le feuillage des lierres, des houx, des ronciers ou d'arbustes sempervirents des bois, voire dans des creux d'arbres, des anfractuosités d'une pierre, sous une écorce ou dans un grenier[...]

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [lien]



Flambé (le) - Iphiclides podalirius

- Habitat : Les plantes hôtes de sa chenille sont le prunelier, les cerisiers dont le cerisier à grappes, les aubépines et aussi les pêchers et les amandiers. [...]
 - Description : L'imago du Flambé est un grand papillon de forme vaguement triangulaire possédant une queue, d'une envergure de 50 à 70 mm (le mâle est plus petit que la femelle) et reconnaissable à ses grands vols planés. [...]
 - Comportement, mode de vie : Il est présent dans presque tous les départements de la France métropolitaine, à l'exception du Finistère, du Nord, du Pas-de-Calais et des Pyrénées-Orientales.
- Des lieux fleuris divers lui conviennent : jardins, vergers, bois clairs, collines, montagnes et ce jusqu'à deux mille mètres [...]

Pour en savoir plus :

- Wikipedia – l'encyclopédie libre. [\[lien\]](#)



Hespérie de la Houque (l') - Thymelicus sylvestris

Urre mazogorria (eu)

- Habitat : L'Hespérie de la houque réside dans les friches, les prairies fleuries, au bord des routes[[...]]
- Description : L'Hespérie de la Houque porte ses ailes antérieures partiellement redressées quand il est posé. C'est un petit papillon d'une envergure de 26 mm à 30 mm aux ailes orange vif bordées de marron [...]
- Comportement, mode de vie : L'Hespérie de la houque vole en une seule génération de début mai à août. Elle hiverne au stade de chenille formée dans l'œuf.



© J. Touroult

© INPN

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [[lien](#)]



© Wikipedia

Piérade de la moutarde (la) - *Leptidea sinapis*

- Habitat : Ses plantes hôtes sont diverses fabacées (légumineuses) : des lotiers, vesces et gesses. La Piérade de la moutarde affectionne les lisières et clairières des bois clairs, les prairies, les friches, qu'elle parcourt d'un vol lent et bas. [...]
- Description : L'imago de la Piérade de la moutarde est un petit papillon blanc d'une envergure de 19 à 24 mm, aux ailes étroites et à l'apex arrondi. Il présente une macule apicale grise sur le dessus de l'aile antérieure, moins marquée chez la femelle que chez le mâle. [...]
- Comportement, mode de vie : *Leptidea sinapis* est (ou était récemment) présent dans toute l'Europe occidentale et du Maroc jusqu'au Caucase et en Syrie. En France métropolitaine, l'espèce est présente dans tous les départements, y compris la Corse. [...]

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia – l'encyclopédie libre. [lien]





Pièride du navet (la) - Pieris napi

Aza-tximeleta marrasendoa (eu)

- Habitat : Ce papillon apprécie les milieux ouverts et humides jusque 1 800 mètres d'altitude . [...]
- Description : C'est un papillon blanc à revers jaune pâle. La longueur de l'aile antérieure de la Pièride du navet varie de 18 à 27 mm. Le papillon connaît un important dimorphisme saisonnier. La première génération (printemps) a le dessous des ailes postérieures jaunes avec des nervures entourées d'une suffusion gris-vert. La seconde génération (été) est plus grande, la coloration des ailes postérieures est plus pâle. [...]
- Comportement, mode de vie : La Pièride du navet vole de mars à novembre en une à quatre générations suivant son habitat (une seule génération en haute montagne et dans la région arctique).

Elle hiverne à l'état de chrysalide.

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [lien]



Piéride de la rave (la) - Pieris rapae *Aza-tximeleta (eu)*

- Habitat : La Piéride de la rave est présente dans de nombreux milieux ouverts ; elle apprécie notamment les jardins et les prairies riches en brassicacées, jusqu'à 2 100 mètres d'altitude. Elle se maintient dans les villes sur les friches temporaires. [...]

- Description : Piéride de la rave est un papillon au-dessus majoritairement blanc et au revers blanc jaunâtre. La longueur de l'aile antérieure varie de 23 à 27 mm[1]. Chez le mâle, le dessus de l'aile antérieure comporte un seul point postdiscal noir, tandis que la femelle en a deux. [...]

- Comportement, mode de vie : En plaine, le papillon peut avoir trois à cinq générations sur l'année mais seulement une à deux en montagne. L'imago est présent de mars à octobre mais est parfois présent dès janvier sur la Côte d'Azur.

L'espèce hiverne à l'état de chrysalide.

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [lien]



Procris (le) - Coenonympha pamphilus

Pikarta biluzia (eu)

- Habitat : Il réside dans les lieux herbus, prairies et friches jusqu'à 1 800 mètres. . [...]
 - Description : Ce petit papillon de couleur ocre clair à marron clair présente d'importantes variations suivant les sous-espèces et les colonies. Le dessus, ocre, présente un ocelle noir cerclé de clair et centré par un point blanc [...]
 - Comportement, mode de vie : Il hiberne à l'état de chenille, et ce sont des chenilles de toutes les générations qui peuvent hiverner.
- Il vole en plusieurs générations, de février à novembre, leur nombre et la date d'émergence varient suivant la localisation de sa résidence

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [lien]

Soufré (le) - Colias hyale



© D. Morel

© INPN

- Habitat : Le soufré affectionne les prairies fleuries, jusqu'à 2 000 m au moins. . [...]

- Description : Sur le verso, le mâle est jaune clair alors que la femelle est blanche et tous deux ont l'apex de l'aile antérieure de forme triangulaire noir taché de clair et un point noir. Le revers est jaune vif chez le mâle et la femelle, celle-ci ayant l'aile antérieure plus blanche. Au centre de l'aile postérieure apparaît une marque blanche cernée de rosé. [...]

- Comportement, mode de vie : Le Soufré hiverne sous forme de chenille. Il vole de mai à septembre, en deux à trois générations. Les plantes hôtes de sa chenille sont des légumineuses, la luzerne et le trèfle.

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [[lien](#)]



Souci (le) - Colias crocea

Kolia (eu)

- Habitat : Il est autochtone dans les régions tempérées du pourtour méditerranéen, et migre au printemps vers l'Europe. Sa présence est signalée dans tous les départements de France métropolitaine. L'espèce affectionne les friches fleuries, jusqu'à environ 2 200 m d'altitude. [...]
- Description : le Souci est un papillon de taille moyenne, dont l'envergure varie de 42 à 54 mm. Le dessus des ailes a un fond jaune orangé avec une tache discoïdale noire à l'aile antérieure, une tache discoïdale orangée à l'aile postérieure, et une épaisse bordure noire aux quatre ailes. [...]
- Comportement, mode de vie : Le Souci est multivoltin et ses imagos volent d'avril à octobre. Il hiverne sous forme de chenille.

Les plantes hôtes de la chenille sont des légumineuses, dont la luzerne et le trèfle.

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [\[lien\]](#)



© INPN

J. Touroult

Tircis (le) - Pararge aegeria

Basozaina (eu)

- Habitat : Le Tircis vit dans les bois clairs, les clairières, les haies et parcs urbains arborés, jusqu'à 1500 m. Le papillon se tient au sol, sur les plantes basses ou sur les feuilles d'arbres dans les taches de soleil des clairières, le long des chemins forestiers et des lisières. [...]
- Description : Le Tircis est un papillon de taille moyenne, ornementé de taches claires sur un fond brun sombre. Ces taches sont de couleur orange pour la sous-espèce *Pararge aegeria aegeria*, et crème pour *Pararge aegeria tircis*, avec des formes intermédiaires. Les ailes antérieures sont tachées d'orange ou crème avec une grande tache à l'apex centrée d'un ocelle noir pupillé de blanc. [...]

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [lien]



Vulcain (le) - Vanessa atalanta

Atalanta vanesa (eu)

- Habitat : L'espèce est migratrice dans le nord de son aire de répartition, alors qu'au sud des Alpes et dans tout l'Ouest de la France, des adultes peuvent survivre à l'hiver. Ils peuvent alors être vus dès février, sortant se réchauffer lors de journées d'hiver ensoleillées. Lors de la migration d'automne, les Vulcains peuvent parcourir 3 000 kilomètres vers le sud en cinq semaines. L'espèce fréquente des habitats très variés. [...]

- Description : Le Vulcain est un papillon très reconnaissable, avec le dessus des ailes marron à noir profond agrémenté d'un motif en 3/4 de cercle orange à rouge vif, formé par une bande transversale sur les ailes antérieures et une frange sur les ailes postérieures. L'apex des ailes antérieures est orné de taches blanches. [...]

- Comportement, mode de vie : La nourriture principale des imagos du Vulcain est le nectar des fleurs, les plus appréciées étant celles de la famille des composées[1]. On voit souvent les Vulcains se nourrir sur les buddleias, les marguerites, les artichauts et bien d'autres fleurs. Ils se nourrissent aussi du jus de fruits tombés au sol et en fermentation en automne.

© H. Bouyon

© INPN

[Pour en savoir plus :](#)

- Wikipedia, l'Encyclopédie libre [\[lien\]](#)