

Index

Agrion jouvencelle
Azuré des Mouillères
Belle-Dame ou Vanesse des chardons
Cordulégastre bidenté
Sphynx de l'euphorbe
Sympetre strie rouge sang
Vulcain ou Vanesse Vulcain



Agrion jouvence (l') (Coenagrion puella)

Orratzontzi arrunt (eu)

Les mâles ont le corps bleu avec un dessin noir sur chaque segment abdominal. Les larves sont aquatiques et carnivores. Les adultes émergent au printemps. Ils sont aussi carnivores et s'éloignent peu du milieu de développement larvaire. Les Oeufs sont insérés dans la végétation aquatique. Lors de la ponte, les femelles peuvent être complètement immergées. Longueur de l'abdomen: 22-32 mm

Diagnose: Les mâles ont le corps bleu avec un dessin noir sur chaque segment abdominal. Le dessin du deuxième segment après le thorax a une forme de U qui n'atteint pas l'extrémité de ce segment. Les dessins des segments 3 à 5 sont généralement très courts.

Détermination: Les mâles sont relativement simples à reconnaître. La détermination des femelles est difficile.

Espèces proches: L'espèce est proche d'autres Agrions. Les dessins sur l'abdomen des mâles sont caractéristiques.

.../...



Agriion jouvencelle (l') (Coenagrion puella) -suite

Orratzontzi arrunt (eu)

.../...

Période d'observation: Les adultes sont observés d'avril à septembre.

Biologie-éthologie: Cette espèce a une génération par an à basse altitude. En montagne, la durée du stade larvaire est plus longue et l'on observe une génération tous les 2 ans. Les larves sont aquatiques et carnivores. Les adultes émergent au printemps. Ils sont aussi carnivores et s'éloignent peu du milieu de développement larvaire. Les oeufs sont insérés dans la végétation aquatique. Lors de la ponte, les femelles peuvent être complètement immergées.

Biogéographie et écologie: L'espèce est présente en Europe. Elle atteint l'ouest de la Sibérie. Elle est commune en France. On la trouve dans de nombreux types d'habitat d'eaux douces stagnantes ou faiblement courantes. On l'observe jusqu'à 2 200 m d'altitude.

Source: Inventaire National du Patrimoine Naturel



Azuré des mouillères (Phengaris alcon alcon)

Gentzianetako inurrijalea (eu)

L'Azuré des Mouillères se retrouve principalement dans les prairies humides jusqu'à 1 400 m d'altitude. Les milieux bien abrités par la proximité de roselières, d'arbres et de buissons lui sont particulièrement favorables. D'une manière générale, l'environnement optimal pour l'Azuré des Mouillères est un ensemble de zones humides de plaine ou de moyenne montagne, (prairies ou landes) liées à une gestion passée par le pâturage.

Noms vernaculaires : L'Azuré des mouillères ou Protée se nomme en espagnol Hormiguera

Description : C'est un petit papillon qui présente un dimorphisme sexuel, le dessus du mâle est bleu terne, brun grisâtre chez la femelle. Le revers est ocre orné de deux lignes de points noirs cerclés de blanc.

Biologie : Il hiverne à l'état de chenille.

Les chenilles sont soignées par des fourmis, *Myrmica ruginodis*, *Myrmica rubra* et *Myrmica scabrinodis*.

.../...

Azuré des mouillères (Phengaris alcon alcon)-suite

.../... Il vole en une génération, de mi-juin à mi-août.

Ses plantes hôtes sont des Gentiana: *Gentiana pneumonanthe* et *Gentiana asclepiadea*

Écologie et distribution : Il est présent dans le sud et le centre de l'Europe du Nord de l'Espagne et de l'Italie aux États Baltes, en Turquie, au Caucase et dans l'Himalaya. En France métropolitaine il serait présent dans une majorité de départements, de la Bretagne aux Alpes, dans les Pyrénées mais absent des départements les plus au sud et les plus au nord.

Biotope : Il réside dans les prairies humides, les zones inondables proches des rivières et des lacs.

Protection : L'Azuré des mouillères est une espèce protégée en France (article 3 de l'arrêté du 23 avril 2007)

Source:Wikipedia



© P. Peyrache

© I.N.P.N



Belle-Dame ou Vanesse des chardons (*Vanessa cardui*)

Kardu- Vanessa (eu)

Le dessus des ailes est de couleur chamois orangé avec des taches noires. L'apex des ailes antérieures est noir avec des taches blanches. Le dessous des ailes antérieures ressemble au dessus, mais avec une forte suffusion de rose. Le dessous des postérieures est marbré de brun clair et de blanc avec une série d'ocelles dans la partie marginale.

La Belle-Dame ou Vanesse des chardons, *Vanessa cardui*, est une espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae. Papillon migrateur, il possède une aire de répartition quasi-cosmopolite, c'est l'espèce diurne la plus répandue dans le monde.

Description : L'imago de la Belle-Dame est un papillon de taille moyenne à grande: la longueur de l'aile antérieure est en général comprise entre 27 et 34 mm. Une grande partie du dessus des ailes consiste en un fond orange à rose saumon orné d'un réseau complexe de taches noires, à l'exception de la partie apicale des ailes antérieures qui est noire à taches blanches. Le dessus des ailes postérieures présente une rangée de quatre à cinq points postdiscaux noirs. Le revers des ailes postérieures est chamarré de beige et de blanc, avec des nervures blanches et cinq ocelles postdiscaux dont certains ont le centre gris-bleu. Les deux sexes sont semblables.



Belle-Dame ou Vanesse des chardons (Vanessa cardui)

.../... Les individus en cours ou en fin de migration sont souvent reconnaissables à l'aspect délavé de leurs ailes, dû à l'altération des écailles qui les composent.

Oeuf : Les œufs sont verdâtres et sphériques, et comportent 12 à 14 crêtes longitudinales. La femelle les dépose un à un sur la face supérieure des feuilles de la plante-hôte.

Chenille : Les chenilles ont une tête noire, un front brun et cinq paires de fausses pattes brunes. Atteignant une taille de 32 mm à maturité, elles prennent un aspect variable selon le stade larvaire. La jeune larve possède un corps noir avec des épines ramifiées blanc-jaunâtre disposées sur des tubercules orangés. [...]Elles se rencontrent de mai à septembre en Europe et en Amérique du Nord, et d'octobre à mars en Afrique du Nord et au Mexique.

Chrysalide : La chrysalide est anguleuse, de couleur gris beige avec des reflets dorés. Elle est ponctuée de points blanchâtres, orangés à dorés qui présentent un mimétisme pour se camoufler, ces points évoquant des gouttes de rosée sur une feuille morte..

Sources: Wikipedia/ Inventaire National du Patrimoine Naturel



[Index insectes](#)

Corduléastre bidenté (Cordulegaster bidentata)

Grande libellule noire et jaune. Cette espèce est typique des cours d'eau à faible débit comme les sources, les suintements, les ruisseaux sableux et les zones de tufs. Elle est présente dans les zones de colline et de moyenne montagne en contexte forestier.

Cordulegaster bidentata, le corduléastre bidenté, est une espèce de libellules appartenant à la famille des Cordulegastridae.

Cet anisoptère est menacé et a été récemment placé sur la liste rouge mondiale de l'UICN en catégorie NT.

Distribution :

Endémique européen, des Pyrénées aux Balkans.

Sources: Inventaire National du Patrimoine Naturel / Wikipedia



J. Tlevenot

© I.N.P.N

 Index insectes

© Cpie Littoral basque 2026



Sphinx de l'euphorbe (Hyles euphorbiae)

De longueur maximale de 8 cm, la chenille, toxique, vu son appétence envers des plantes elles-mêmes toxiques, est très visible car vivement colorée, c'est un exemple d'aposématisme (couleurs d'avertissement). Le sphinx de l'euphorbe se rencontre depuis le sud et le centre de l'Europe jusqu'en Asie centrale. [photo © H. Bouyon - INPN/MHN]

Description Chenille : De longueur maximale de 8 cm, la chenille, toxique, vu son appétence envers des plantes elles-mêmes toxiques, est très visible car vivement colorée, c'est un exemple d'aposématisme (couleurs d'avertissement).

Aire de répartition : Le sphinx de l'euphorbe se rencontre depuis le sud et le centre de l'Europe jusqu'en Asie centrale. Pratiquement partout en France.

Habitat : En Europe, il est principalement associé à l'euphorbe petit-cyprès, (*Euphorbia cyparissias*), mais il se rencontre également sur *Euphorbia esula*

Sources: Inventaire National du Patrimoine Naturel / Wikipedia



Sympète strié rouge sang (*Sympetrum sanguineum*)

Suburduntzi zain-gorri (eu)

Petite libellule rouge (mâle) ou jaune et noir (femelle et juvénile). Les pâtes sont noires. Les adultes sont observés d'avril à novembre dans le sud, de mai à octobre dans le nord. Cette espèce se reproduit dans les eaux stagnantes et faiblement courantes, et bien ensoleillées. Elle occupe également des milieux saumâtres ou anthropisés

Description et caractéristiques : L'abdomen du mâle est plus rouge et plus élargi que celui des autres *Sympetrum*.

La femelle, comme chez l'ensemble des *Sympetrum*, sauf peut-être chez *Sympetrum fonscolombii*, est plus grisâtre (parfois l'abdomen est teinté de rouge chez de vieilles femelles); elle se distingue du *sympétrum* strié par la couleur noire des pattes et par la forme de la lame vulvaire.

Distribution : Eurasiatique, il est largement répandu sur l'ensemble de l'Europe continentale (sauf le nord de la Scandinavie) jusqu'en Sibérie.

.../...



Sympète strié rouge sang (*Sympetrum sanguineum*)

.../...

Habitat et mode de vie :

Cette espèce apprécie les eaux stagnantes ou faiblement courantes riches en végétation, permanentes ou temporaires (plus rarement les rivières au courant plus rapide) et on la rencontre même loin de l'eau, des lisières de forêts jusqu'aux jardins urbains ensoleillés.

Migratrices, ces libellules se rassemblent parfois en groupes importants comme dans la vallée du Rhône.

L'espèce est visible à partir de mai et jusqu'en octobre, parfois même jusqu'aux premières gelées de novembre si le début de l'automne demeure ensoleillé.

Sources: Inventaire National du Patrimoine Naturel / Wikipedia



© H. Bouyon

© I.N.P.N

Vulcain (le) - Vanessa atalanta

Atalanta vanesa (eu)

- Habitat : L'espèce est migratrice dans le nord de son aire de répartition, alors qu'au sud des Alpes et dans tout l'Ouest de la France, des adultes peuvent survivre à l'hiver. Ils peuvent alors être vus dès février, sortant se réchauffer lors de journées d'hiver ensoleillées. Lors de la migration d'automne, les Vulcains peuvent parcourir 3 000 kilomètres vers le sud en cinq semaines. L'espèce fréquente des habitats très variés. [...]

- Description : Le Vulcain est un papillon très reconnaissable, avec le dessus des ailes marron à noir profond agrémenté d'un motif en 3/4 de cercle orange à rouge vif, formé par une bande transversale sur les ailes antérieures et une frange sur les ailes postérieures. L'apex des ailes antérieures est orné de taches blanches. [...]

- Comportement, mode de vie : La nourriture principale des imagos du Vulcain est le nectar des fleurs, les plus appréciées étant celles de la famille des composées[1]. On voit souvent les Vulcains se nourrir sur les buddleias, les marguerites, les artichauts et bien d'autres fleurs. Ils se nourrissent aussi du jus de fruits tombés au sol et en fermentation en automne.

 Index insectes