

Les Barthes de la Nivelle

Oiseaux sédentaires ou nicheurs

Pour les liens internet : cliquer sur le terme entre []

- les textes sont extraits de la base [[Oiseaux.net](#)]
- les vignettes proviennent du [[Museum National d'Histoire Naturelle](#)]
- les sons, photo et vidéos de la base [[E-Birds](#)]
- voir aussi : [[Oiseaux terrestres et marins dans les pyrénées atlantiques](#)] : changement climatique, migration et évolution des populations / Castège, Iker; Milon, Emilie; Isturitz, Ainhoa et al. - Biarritz : ERMMA, 2022. - 62 p



Faune et Flore



Cartographie historique

Index

Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Cisticole des joncs
Corneille noire
Faucon hobereau
Geai des chênes
Goéland leucophaée
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Héron cendré
Marouette ponctuée
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Oie cendrée
Oie rieuse
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon biset domestique
Poule d'eau

Râle d'eau
Rouge gorge familier
Troglodyte mignon



Faune et Flore



Cartographie historique



Buse variable (la)

Zapelaitz arrunta (eu) –Busardo ratonero (es)

- Description :

Longueur 55 cm ; Envergure jusqu'à 1,30 m.

- Habitat :

La Buse variable est avant tout un oiseau forestier. Il a besoin des arbres pour la nidification. Son nid sera toujours proche d'une zone ouverte, prairie, culture ou zone humide. Un arbre isolé dans la campagne agricole peut convenir pour la nidification à condition qu'il soit assez dense et cache le nid.

- Alimentation :

La buse recherche avant tout les petits rongeurs tels que les campagnols des cultures qu'elle chasse à l'affût depuis un perchoir élevé ou alors en vol sur place lorsque le temps s'y prête.

- Ponte : 2 à 4 œufs

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 25 ans

-[[Chant /Cri](#)] 

-[[Photos](#)] 

-[[Vidéos](#)] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [[lien](#)] - Oiseaux.net . [[lien](#)]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [[lien](#)]



[Index général](#)



Canard colvert (le)

Basahatea (eu) - Ánade real (es)

- Description :

Longueur 50-65 cm, envergure 81-98 cm, poids 750-1 450 g.

- Habitat :

Il fréquente toutes sortes de milieux humides, eaux stagnantes comme courantes de toutes tailles, du petit point d'eau saisonnier aux plus grands plans d'eau et du petit ruisseau aux plus grandes rivières.

- Alimentation :

Le Canard colvert est un canard de surface dit "barboteur" : la nourriture animale domine (escargots, limaces, lombrics, insectes et leurs larves, petits poissons, têtards...). Son bec est capable de filtrer des proies aquatiques de petite taille.

- Ponte : 8 à 10 œufs vert pâle

- Migrateur : oui

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 29 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Chardonneret élégant (le)

Karnaba(eu) - Jilguero (es)

- Description :

Taille : 14 cm Poids : 14 à 18 g

- Habitat :

Le Chardonneret élégant est un oiseau assez commun des milieux boisés ouverts, qu'ils soient feuillus ou mixtes.

- Alimentation :

Il se nourrit en toutes saisons de graines très diverses, que ce soit de plantes herbacées (chardons, asters, tussilage, etc.), mais également d'arbres (bouleaux, aulnes, pins, etc.).

- Ponte : 4 à 5 œufs bleu pâle, tachetés de brun rougeâtre.

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 8 ans

- [Chant /Cri] 

-[Photos] 

- [Vidéos] 

Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Cisticole des joncs (la)

Ihi- txoria (eu) – Cistícola buitrón (es)

- Description :

Taille : 10 cm Poids : 5 à 12 g

- Habitat :

Les Cisticoles des joncs habitent les prairies ouvertes de longues herbes, les friches abandonnées et les lisières des terres agricoles.

Ils s'installent très souvent à l'intérieur ou à proximité de zones humides telles que les marais, les étendues inondées, les prairies imbibées d'eau, les fossés au bord des routes.

- Alimentation :

La Cisticole des joncs est insectivore mais elle ne dédaigne pas pour autant les petites graines des plantes palustres. Quand elle se déplace dans les joncs, elle recherche assidûment les araignées

- Ponte : 4 à 5 œufs de couleur variable, blancs, rosâtre pâle, verdâtres ou azurés

- Espèce menacée : non

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [[lien](#)] - Oiseaux.net . [[lien](#)]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [[lien](#)]



[Index général](#)



P. Gourdain

Corneille noire (la)

Belabeltza (eu) – Corneja negra (es)

- Description :

Longueur 53 cm ; Envergure jusqu'à 100 cm.

- Habitat :

La Corneille noire est une espèce commune, présente dans tous les milieux ouverts et semi-ouverts, du niveau de la mer à l'étage alpin. Les surfaces toujours en herbe, naturelles ou non, (prairies de fauche, pâtures, pelouses, steppes) lui sont aussi favorables. Les milieux littoraux (traits de côte, estuaires, grands marais) et les milieux d'altitude (pelouses alpines jusque vers 2 000 m dans les Alpes et même plus de 3 000 m dans les montagnes d'Asie centrale) sont également habités.

- Alimentation :

La corneille recrache par la bouche les restes indigestes des invertébrés et même des petits vertébrés qui composent son régime. On y trouve toutes sortes d'insectes, en particulier des coléoptères. Les lombrics jouent un grand rôle dans son alimentation. Elle se nourrit également des cadavres des animaux tués par les voitures

- Ponte : 3 à 5 œufs, le plus souvent 4, verts et tachés de brun

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 20 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



[Index général](#)



Faucon hobereau (le)

Zuhaitz balatza (eu) – Alcotán europeo (es)

- Description :

Longueur totale : 30 à 31 cm. Poids : 224 à 257 g.

- Habitat :

Son habitat favori est constitué par les lisières de bois ou boqueteaux, de préférence dans les zones humides. Il fréquente aussi les terrains découverts, en particulier les landes et terres cultivées avec arbres.

- Alimentation :

Le Faucon hobereau se nourrit de petits oiseaux (notamment d'hirondelles et de martinets) et de grands insectes (libellules et cerfs-volants) capturés en vol, ou au sol en marchant pour d'autres espèces.

- Ponte : 2 à 3 oeufs

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 11 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéo] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]
- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



[Index général](#)



Geai des chênes (le)

Eskinosoa (eu) - Arrendajo común (es)

- Description :

Longueur 35 cm ; Envergure jusqu'à 55 cm.

- Habitat :

Le Geai des chênes est un oiseau forestier en période de reproduction. Dans sa large aire de répartition, il occupe tous types de forêts. En Europe occidentale, c'est avant tout un oiseau de plaine ou de moyenne montagne et sa préférence va aux forêts de feuillus, chênaie-charmaie et hêtraie.

- Alimentation :

Les graines assurent sa subsistance à la mauvaise saison. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Geai des chênes car il est friand de glands qui constituent près de 50% de son alimentation en été puis qu'il cache en automne pour l'hiver.

- Ponte : 5 à 7 œufs , vert pâle avec des taches vert sombre à gris-vert.

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 18 ans

- [Chant /Cri]

- [Photos]

- [Vidéos]

Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Goéland leucopnée (le)

Kaio hankahoria (eu) – Gaviota (es)

- Description :

Taille : 68 cm Envergure : 130 à 158 cm. Poids : 750 à 1250 g

- Habitat :

Pendant la saison de reproduction, le leucopnée occupe les côtes maritimes de l'océan Atlantique (de la Loire au sud du Maroc et autour des îles de Macaronésie) et de la Méditerranée et de ses îles. Il niche en colonies sur les falaises de mer et versants abrupts couverts de végétation, les dunes littorales, les îles rocheuses ou sableuses, les lagunes, les marais côtiers, les salines et de plus en plus en milieu urbain, par exemple sur les toits.

- Alimentation :

Son régime alimentaire se compose bien sûr de poissons, vivants ou morts, d'invertébrés aquatiques (mollusques, crustacés) et terrestres (gros insectes, vers, petits mammifères comme les campagnols, oiseaux.

- Ponte : 2-3 œufs

- Migrateur : non

- Espèce menacée : non

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Grimpereau des bois (le)

Baoetako gerri-txoria (eu) – Agateador euroasiático (es)

- Description :

Taille : 12 cm Envergure : 17 à 21 cm. Poids : 8 à 11 g

- Habitat :

A l'ouest de son aire, en France par exemple, le Grimpereau des bois est nettement un montagnard, régulier au-dessus de 1000 m d'altitude. () Il s'aventure dans l'étage collinéen et même localement en plaine à la faveur des grands massifs forestiers.

- Alimentation :

Les grimpereaux recherchent leur nourriture sur les troncs et les branches, dont ils inspectent minutieusement l'écorce , () les mousses, lichens et plantes supérieures, pour y dénicher les invertébrés .

- Ponte : 5 à 6 oeufs blancs légèrement tachetés de brun clair

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 7 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Grive musicienne (la)

Birigarro arrunta (eu) – Zorzal común (es)

- Description :

Taille : 23 cm Envergure : 33 à 36 cm. Poids : 65 à 90 g

- Habitat :

C'est une espèce forestière pour la reproduction. Elle est peu exigeante quant à l'habitat, ce qui lui permet d'occuper de nombreux faciès forestiers, feuillus, conifériens ou mixtes, en plaine comme en altitude. Elle peut se satisfaire de petits bois et de bosquets....

- Alimentation :

Elle consomme de nombreux invertébrés, particulièrement des arthropodes (insectes et leurs larves, myriapodes, crustacés terrestres), des oligochètes, des mollusques (petits escargots dont elle casse la coquille)

- Ponte : 3 à 5 œufs d'un bleu-vert vif avec quelques rares taches brun-noir.

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 14 ans

- [[Chant /Cri](#)] 

- [[Photos](#)] 

- [[Vidéos](#)] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [[lien](#)] - Oiseaux.net . [[lien](#)]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [[lien](#)]



[Index général](#)



Grimpereau des jardins (le)

Gerri-txori arrunta (eu) – Agateador europeo (es)

- Description :

Taille : 12 cm Poids : 8 à 12 g

- Habitat :

Le Grimpereau des jardins est à l'origine un oiseau forestier lié aux facies feuillus de basse altitude, particulièrement la vieille chênaie. Le nombre de vieux arbres doit être important mais il préfère la futaie un peu claire. Il apprécie le bord des eaux ...

- Alimentation :

Les grimpereaux recherchent leur nourriture sur les troncs et les branches, dont ils inspectent minutieusement l'écorce et les épiphytes pour y dénicher les invertébrés et leurs formes de résistance, et ceci en toutes saisons car ils sont sédentaires.

- Ponte : 5 à 7 oeufs blancs tachetés de brun rouge

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 9 ans

- [Chant /Cri] 

-[Photos] 

-[Vidéos] 

Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Héron cendré (le)

Lertxun gorria (eu) – Garza real (es)

- Description :

Longueur 90-98 cm, envergure 175-195 cm, poids 1-2 kg.

- Habitat :

Le Héron cendré fréquente toutes les eaux douces ou saumâtres à condition qu'elles soient poissonneuses. En intersaison, il fréquente également les milieux agricoles dans sa chasse aux rongeurs et autres proies terrestres.

- Alimentation :

Le Héron cendré se nourrit essentiellement de poissons, en particulier pour l'alimentation des jeunes. Le régime inclut aussi des amphibiens comme les grenouilles, certains invertébrés comme les écrevisses et des taxons amphibiens tels que couleuvre à collier, musaraigne aquatique....

- Ponte : 3 à 5 œufs mats, d'un bleu-vert clair.

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 25 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



[Index général](#)



Marouette ponctuée (la)

Uroilanda pikarta (eu) – *Polluela pintoja* (es)

- Description :

Longueur totale du corps : environ 24 cm, pour une envergure de 37 à 42 cm. Poids : 60 à 115 g.

- Habitat :

La marouette ponctuée vit dans les marais, les zones humides, les prairies steppiques humides, dans la végétation dense des marais avec des surfaces vaseuses.

- Alimentation :

La marouette ponctuée se nourrit de coléoptères, nymphes de libellules, insectes aquatiques, chenilles, mollusques, graines de plantes aquatiques.

- Ponte : 8 à 12 oeufs olive ocré, très tachetés.

- Espèce menacée : oui

- Durée de vie : 7 ans

- [Chant /Cri]



- [Photos]



- [Vidéos]



Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Merle noir (le)

Zozo arrunta (eu) – Mirlo común (es)

- Description :

Longueur 24 cm, envergure 38 cm, poids moyen 100 g.

- Habitat :

Le Merle noir est une espèce forestière (...) capable d'occuper pratiquement tous les milieux arborés, depuis les forêts profondes jusqu'au cœur des grandes villes.

- Alimentation :

Suivant la saison et l'humidité du sol, il peut être porté soit vers les vers de terre au sens large dont c'est un grand consommateur, en particulier au moment de l'élevage des jeunes, soit vers les insectes et leurs larves (...)

- Ponte : 3 à 6 œufs vert clair, tachetés de brun-roux

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 16 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]





Mésange à longue queue (la)

Buztanluzea (eu) - Mito común (es)

- Description :

Taille : 16 cm Poids : 7 à 9 g

- Habitat :

Son habitat optimal est constitué par les forêts de feuillus et les boisements mixtes de feuillus et de conifères, ainsi que par les parcs et les jardins, les haies et bosquets.

- Alimentation :

L'espèce se nourrit (...) surtout d'insectes, de leurs larves et de leurs œufs, ainsi que d'autres petits invertébrés. À l'aide de son bec menu, elle déloge ses proies des interstices tels que les fentes de l'écorce des arbres. Elle cueille aussi des insectes, comme les pucerons, sur les feuilles et les bourgeons.

- Ponte : 6 à 12 oeufs

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 8 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos]



- [Vidéos]



[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



[Index général](#)



Martinet noir (le)

Sorbeltz arrunta (eu) – Vencejo común (es)

- Description :

Longueur 16-17 cm, envergure 42-48 cm, poids 31-56 g.

- Habitat :

falaises, porches de grottes, etc., accessoirement aux trous d'arbres, l'espèce s'est adaptée aux constructions humaines au point d'avoir délaissé complètement ou presque son habitat originel.

- Alimentation :

surtout des insectes volants, dont certains se laissent emporter les jours de beau temps par les vents et les courants aériens jusqu'à grande hauteur.

- Ponte : 1 à 4 œufs blancs

- Migrateur : non

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 21 ans

- [Chant /Cri]



- [Photos]



- [Vidéos]



Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Mésange bleue (la)

Amilotx urdina (eu) – Herrerillo común (es)

- Description :

Longueur 11,5 cm, envergure 17,5-20 cm, poids 9-12 g.

- Habitat :

La Mésange bleue est une espèce forestière dont l'optimum écologique est en forêt de feuillus. C'est typiquement l'oiseau de la chênaie en Europe.

- Alimentation :

À la belle saison, la Mésange bleue est essentiellement insectivore. Les chenilles de lépidoptères (papillons) entrent pour une bonne part dans son régime, surtout au moment de l'élevage des jeunes.

- Ponte : 9 à 13 œufs

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 15 ans

- [Chant /Cri]



- [Photos]



- [Vidéos]



Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]
- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



© R. Clerc

Mésange charbonnière (la)

Kaskabeltz handia (eu) - Carbonero común (es)

- Description :

Longueur 14 cm ; Envergure environ 25 cm.

- Habitat :

La Mésange charbonnière est un oiseau forestier fréquentant de nombreux facies différents y compris conifériens, mais avec une préférence pour les forêts caducifoliées. En Europe, sa préférence va à la chênaie.

- Alimentation :

La Mésange charbonnière a un régime alimentaire diversifié, qui peut se décliner en deux parties. A la belle saison, ce régime est basé sur une alimentation animale et est alors largement insectivore.

- Ponte : le plus souvent de 5 à 12

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 15 ans

- [Chant /Cri]

- [Photos]

- [Vidéos]

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [[lien](#)] - Oiseaux.net . [[lien](#)]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [[lien](#)]



[Index général](#)



Oie cendrée (l')

Antzara hankagorritzta (eu) – Ánsar común (es)

- Description :

Longueur totale : 75 à 90 cm. Poids : 2,5 à 4,5 kg (mâle), 2 à 4 kg (femelle).

- Habitat :

Au printemps, elle fréquente les marécages, les bords des lacs à la végétation riveraine importante. En hiver, elle recherche la douceur côtière et les endroits abrités. On la retrouve donc plutôt en bordure des réservoirs artificiels, des lacs et des estuaires mais aussi dans les prairies vallonnées

- Alimentation :

C'est une végétarienne exclusive. Compte-tenu de son environnement, uniquement de la verdure à son menu : plantes herbacées aquatiques ou terrestres, racines, tubercules, graines.

- Ponte : 4 à 9 œufs

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 17 ans

- [Chant /Cri]



- [Photos]



-[Vidéos]



[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



[Index général](#)



Oie rieuse (l')

Antzara muturzuria (eu) – Ánsar careto (es)

- Description :

Taille : 86 cm Envergure : 130 à 165 cm. Poids : 1400 à 3300 g

- Habitat :

Son aire de nidification se situe au nord-est de la Russie, en Sibérie, au nord de l'Amérique du Nord et au Groenland.

- Alimentation :

C'est un herbivore exclusif. L'Oie rieuse se nourrit en eau peu profonde à la recherche de pousses et de plantes herbacées. Dans les pâturages et les prairies humides, l'essentiel de son alimentation est constitué par des graminées et d'autres plantes herbacées sauvages des terrains salés côtiers.

- Ponte : 5 à 6 œufs

- Migrateur : oui

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 18 ans

- [[Chant /Cri](#)] 

- [[Photos](#)] 

- [[Vidéos](#)] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [[lien](#)] - Oiseaux.net . [[lien](#)]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [[lien](#)]



[Index général](#)



Pic épeiche (le)

Okil handia (eu) - Pico picapinos(es)

- Description :

Longueur 23 cm ; Envergure jusqu'à 39 cm.

- Habitat :

Le Pic épeiche est une espèce forestière (...) fréquentant dans sa vaste aire de distribution toutes sortes de boisements caducifoliés, sempervirents ou mixtes, du niveau de la mer à plus de 2 000 mètres d'altitude.

- Alimentation :

Le Pic épeiche a un régime alimentaire très varié. À la belle saison, la part animale prédomine. L'oiseau recherche activement les larves xylophages d'insectes tels que les cérambycidés ou les scolytidés qu'il extirpe du bois avec son bec et sa langue, travaillant de bas en haut le long des troncs et des branches.

- Ponte : 5 à 7 œufs blancs

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 11 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



© Julien Bonnaud

Pic vert, Pivert (le)

Okil berdea (eu) – Pito real euroasiático (es)

- Description :

Taille : 33 cm Envergure : 40 à 42 cm. Poids : 180 à 220 g

- Habitat :

Le Pic vert est une espèce forestière liée aux boisements feuillus, mais pouvant aussi fréquenter les forêts mixtes en altitude et au nord de son aire.

Plutôt que la futaie dense, l'espèce affectionne les facies ouverts du milieu forestier, clairières et lisières ...

- Alimentation :

Bien qu'il soit très arboricole, ce n'est pas dans le bois que le Pic vert recherche sa nourriture. Il se nourrit au sol qu'il parcourt en sautillant à la recherche des fourmilières.

- Ponte : 5 à 7 œufs

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 7 ans

- [Chant /Cri]



- [Photos]



- [Vidéos]



Pour en savoir plus :

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Pie bavarde (la)

Mika (eu) – Urraca común (es)

- Description :

Longueur 50 cm ; Envergure jusqu'à 61 cm.

- Habitat :

La Pie bavarde occupe tous les habitats terrestres ouverts et semi-ouverts. La condition de sa présence est qu'il y ait au moins quelques ligneux pour la nidification. Pour cela, elle n'est pas exigeante et quelques arbustes peuvent lui suffire, surtout là où la présence humaine est faible.

- Alimentation :

La Pie bavarde se nourrit presque exclusivement au sol. Elle peut être qualifiée d'omnivore, mais elle est avant tout un prédateur. Son régime est nettement insectivore au sens large à la belle saison, mais les petits vertébrés y entrent aussi pour une bonne part.

- Ponte : 4 à 9 œufs gris-vert tachetés de brun

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 15 ans

- [Chant /Cri]

- [Photos]

- [Vidéos]

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



Index général



Pigeon biset (le)

Haitz-usoa (eu) – Paloma bravía (es)

- Description :

Longueur 32 cm, envergure 65 cm, poids moyen 300 g.

- Habitat :

En dehors de la période de reproduction, les pigeons bisets forment des rassemblements qui, là où ils existent, sont relativement nombreux. Dans les endroits rocailleux qui constituent leur habitat préféré, les couples trouvent refuge dans les fissures et sur les corniches. Dans les villes et dans les villages, ils s'abritent et se reproduisent dans les cavités, les trous, les toits et les terrasses des bâtiments..

- Alimentation :

Le pigeon biset se nourrit à terre surtout de graines sauvages ou cultivées, parfois de mollusques et d'escargots. En ville de graines et de miettes.

- Ponte : 2 oeufs de couleur blanche

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 6 ans

- [Chant /Cri]

- [Photos]

- [Vidéos]

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



[Index général](#)



Poule-d'eau (la)

Uroila arrunta (eu) - Gallineta común (es)

- Description :

Longueur 35 cm ; Envergure jusqu'à 55 cm.

- Habitat :

Elle occupe les eaux douces ou saumâtres, les zones humides où la végétation est abondante et émergente, avec des rives proposant refuge et nidification. On la trouve près des étangs, des rivières calmes, des fossés, des marais et des lacs, ainsi que dans les eaux des parcs urbains ou autres zones humides.

- Alimentation :

Elle arrache des plantes aquatiques, de l'herbe, des mousses, des feuilles des arbres et des buissons, mais se nourrit aussi de mollusques, d'insectes, de vers de terre, parfois de petits poissons, de têtards et d'œufs d'oiseaux.

- Ponte : 5 à 8 œufs lisses et brillants, blanc cassé ou chamois

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 15 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [lien] - Oiseaux.net . [lien]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [lien]



[Index général](#)



Râle d'eau (le)

Uroilanda handia (eu) – Rascón europeo (es)

- Description :

Longueur totale : 23 à 28 cm. Poids : 90 à 160 g.

- Habitat :

Le râle d'eau vit caché dans les roseaux touffus des étangs, marais et rivières aux eaux peu profondes, bien qu'on puisse parfois l'apercevoir en limite de roselière. Il migre à l'automne vers le sud-ouest de l'Europe.

- Alimentation :

Le râle d'eau se sert de son long bec effilé pour se nourrir. Grâce à lui, il fouille la vase à la recherche de vers et de sangsues et brise la carapace des crevettes d'eau douce, des écrevisses et des insectes.

- Ponte : 6 à 10 oeufs

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 6 ans

- [[Chant /Cri](#)]

- [[Photos](#)]

- [[Vidéos](#)]



[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [[lien](#)] - Oiseaux.net . [[lien](#)]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [[lien](#)]



[Index général](#)



Rougegorge (le) familier

Txantxangorria (eu) - Petirrojo (es)

- Description :

Longueur 14 cm ; Envergure jusqu'à 22 cm.

- Habitat :

La forêt est le milieu optimal qu'il fréquente sur les lieux de reproduction. Mais de là, il déborde sur d'autres milieux arborés favorables tels que les forêts riveraines des cours d'eau, les parcs, les haies arborées, etc. À la mauvaise saison, il quitte largement la forêt...

- Alimentation :

Le Rougegorge familier est essentiellement insectivore, tout particulièrement à la belle saison, mais aussi au sud en hiver Il se nourrit d'insectes et de leurs larves (coléoptères et diptères particulièrement) et de divers petits invertébrés (arachnides, myriapodes,...). À la mauvaise saison, il se tourne volontiers vers les petits fruits charnus tels que les baies de divers arbustes.

- Ponte : 5 à 7 œufs blanc bleuté avec des taches rouges

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 15 ans

-[[Chant /Cri](#)] 

-[[Photos](#)] 

-[[Vidéos](#)] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [[lien](#)] - Oiseaux.net . [[lien](#)]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [[lien](#)]



[Index général](#)



© Claire Martin

Troglodyte mignon (le)

Txorru arrunta (eu) – Chochín paleártico (es)

- Description :

Longueur 10 cm ; Envergure environ 15 cm.

- Habitat :

Le Troglodyte mignon est avant tout une espèce forestière affectionnant les faciès humides des forêts feuillues et mixtes dont il fréquente la strate inférieure. Ses mœurs exigent un sous-bois dense et riche, mais aussi avec un accès facile au sol.

- Alimentation :

Le Troglodyte mignon a un régime insectivore toute l'année. Il se nourrit surtout d'arthropodes, insectes divers et leurs larves, araignées,... Il s'attaque également à l'occasion à de mini-vertébrés tels que les alevins de poissons ou les têtards d'amphibiens.

- Ponte : 5 à 7 œufs blancs tachetés de rougeâtre

- Espèce menacée : non

- Durée de vie : 6 ans

- [Chant /Cri] 

- [Photos] 

- [Vidéos] 

[Pour en savoir plus :](#)

- INPN - Inventaire National du Patrimoine Naturel. [[lien](#)] - Oiseaux.net . [[lien](#)]

- E-birds Cornell Lab of Ornithology et National Audubon Society [[lien](#)]



[Index général](#)